



ProACE
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
E ESTUDANTIS

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À
SAÚDE

Fone/Fax: (016) 3351-8200
 deas@ufscar.br

ATENÇÃO PARA AS VACINAS QUE PRECISAM SER TOMADAS



Esquema de vacinação para Adultos entre 20 – 59 anos ¹

2017

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINA	ESQUEMA
PRIMEIRA VISITA	dT ² HEPATITE B SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA - SCR ³	PRIMEIRA DOSE PRIMEIRA DOSE DOSE
2 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	dT HEPATITE B ⁴ FEBRE AMARELA ⁵	SEGUNDA DOSE SEGUNDA DOSE DOSE ÚNICA
4-6 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	dT HEPATITE B ⁶	TERCEIRA DOSE TERCEIRA DOSE
A CADA 10 ANOS POR TODA A VIDA	dT ⁷	REFORÇO

Norma Técnica do Programa de Imunização – São Paulo - 2016



Esquema de vacinação para Adultos entre 20 – 59 anos ¹

2017

Notas

1 – Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacina incompleto, é suficiente completar o esquema iniciado.

2 – Caso o adulto tenha recebido 3 ou mais doses das vacinas DTP, DT, dT, aplicar uma dose de reforço, se decorridos 10 anos da última dose.

3 – Para pessoas de 20 a 29 anos de idade recomenda-se duas doses da vacina SCR. Adultos acima de 30 anos e os nascidos a partir de 1960, devem ter pelo menos uma dose. A vacina também está disponível para mulheres no puerpério. Caso não tenha sido administrada no puerpério, administrá-la na primeira visita ao serviço de saúde.

4 – O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina hepatite B é de 4 semanas.

5 – Para aqueles que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica.

6 – O intervalo para a terceira dose da vacina hepatite B pode ser de 2 meses após a segunda, desde que o intervalo de tempo decorrido da primeira dose seja, no mínimo, de 4 meses.

7 – Na profilaxia do tétano, após alguns tipos de ferimentos, deve-se reduzir este intervalo para 5 anos.

Nota: A vacina HPV está disponível para jovens até 26 anos de idade vivendo com HIV/Aids, submetidos a transplantes de órgãos sólidos, transplantados de medula óssea ou pacientes oncológicos (esquema de 3 doses – 0,2,6 meses).

Vacina dT - vacina adsorvida difteria e tétano (dupla tipo adulto)

http://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/imunizacao/doc/vacinacao2017_calendario.pdf

SÃO CARLOS É ÁREA COM RECOMENDAÇÃO DE VACINAÇÃO PARA FEBRE AMARELA

Marta Maria Troiano Cury, Luis Eduardo Andreossi, Lilian Fantato Noronha da Costa
 Departamento de Atenção à Saúde-DeAS
 Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de São Carlos-ProACE
 2018